



Avertissements[®]

agricoles Auvergne & Limousin

ISSN : 0763 - 7756

Grandes cultures

Le 19 Août 1988

n°15

BETTERAVE SUCRIERE

Cercosporiose, Oïdium et Rouille : à surveiller

MALADIES

* Situation

● Cercosporiose : en général maladie bien contrôlée par le premier traitement mais présence de foyers dans le secteur du BROU (63) et dans l'Allier.

La cercosporiose peut être également confondu avec la ramulariose qui est faiblement présente :

CERCOSPORIOSE

- Taches grises bordées d'un liseré rouge ou brun
- Sporulation noire et feutrage gris peuvent apparaître au centre des taches.

RAMULARIOSE

- Taches plus grandes, à contour irrégulier marron clair, parfois à marge brune, qui s'élargissent et confluent.
- Sporulation blanche

● Oïdium : en général maladie bien contrôlée par le premier traitement, présence de foyers dans le secteur de Plauzat, La Sauvetat (63) et dans l'Allier.

● Rouille : présence en Limagne Nord, secteur de Ménétréol, Gerzat, Clerlande, absence dans l'Allier.

* Préconisations

- Dans le cas où aucun traitement n'a été réalisé, visiter de toute urgence vos parcelles, et intervenir impérativement avec un fongicide systémique polyvalent en cas de présence de cercosporiose, d'oïdium ou de rouille.

- Si un premier traitement a été réalisé depuis plus de 3 semaines, bien surveiller vos parcelles contre un éventuel développement des maladies et intervenir le cas échéant.

NOCTUELLES

Attaques peu importantes. N'intervenir qu'en cas de fortes infestations.
(Matières actives : deltaméthrine, cyperméthrine).

720